

## ЦЕРНИЛТОН ФОРТЕ N50 КАПС

### Категория

Урологические

### Страна происхождения:

- СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

### Количество в упаковке:

- 50

### Производитель:

- Граминэкс Л.Л.С.

### Код АТХ:

- G04CX Препараты для лечения доброкачественной гипертрофии простаты другие



## Подробная информация о препарате

Капсулы. По 50 капсул во флакон темного стекла. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### 1. Состав и форма выпуска

Капсулы. По 50 капсул во флакон темного стекла. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### 2. Лекарственная форма

Твердые растительные капсулы темно - зеленого цвета, со специфическим запахом, наполненные порошком бежевого цвета.

### 3. Состав

1 капсула содержит:

Активные вещества: Graminex® G60 (водорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений) - 120,00 мг; Graminex® GFX (жирорастворимая фракция микробиологически ферментированного экстракта пыльцы растений) - 6,00 мг.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кремния

диоксид коллоидный, мальтодекстрин 10DE, кальция стеарат, монокальция фосфат.

#### **4. Фармакодинамика**

Цернилтон® форте оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, способствует регуляции метаболических процессов.

Одним из фармакологических свойств препарата является дозозависимое ингибирование ЦОГ и 5-липооксигеназы, что приводит к угнетению синтеза медиаторов воспаления цикла арахидоновой кислоты: простагландинов и лейкотриенов и, как следствие, к уменьшению воспаления и отека ткани простаты. Препарат способствует устранению болевого синдрома. Цернилтон® форте обладает миорелаксирующим действием, что приводит к расслаблению гладкомышечных элементов задней стенки уретры и улучшению мочеиспускания.

Препарат уменьшает объем предстательной железы за счет ингибирования 5- $\alpha$ -редуктазы, избирательно блокирует  $\alpha$ 1-адренорецепторы гладкомышечных элементов уретры, оказывает антиандрогенное действие. Способствует улучшению эректильной функции.

#### **5. Фармакокинетика**

Данные отсутствуют.

Фармакокинетические свойства препарата Цернилтон форте определяются совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным; превращение всех компонентов не может быть прослежено с помощью маркеров или биологических исследований

#### **6. Побочные действия**

При повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

#### **7. Особенности продажи**

Отпускается без рецепта

#### **8. Особые условия**

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом. Оптимальную схему и повторные курсы лечения устанавливает и назначает врач индивидуально в каждом конкретном случае на основе диагностического обследования.

Применение препарата при хроническом бактериальном простатите возможно в сочетании с антибактериальными средствами, по назначению и под контролем врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

## 9. Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период трудного вскармливания.

Применение препарата у женщин, в том числе при беременности и в период грудного вскармливания, не предусмотрено.

## 10. Лекарственное взаимодействие

Сведения о взаимодействии лекарственного препарата Цернилтон® форте с другими лекарственными средствами отсутствуют

## 11. Дозировка

Дозировка

Препарат применяется внутрь за 30 минут до еды, запивая небольшим количеством воды.

Острый простатит: по 2 капсулы 3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяется лечащим врачом и составляет обычно 3 месяца.

Хронический простатит: по 1 капсуле 3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально лечащим врачом и составляет обычно от 3 до 6 месяцев.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: по 1 капсуле 3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально лечащим врачом и составляет обычно от 6 до 12 недель, но может быть увеличена до 6 месяцев.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не наблюдались.